




SOLUÇÕES LÍQUIDAS, SUSTENTÁVEIS E DE ALTA PRODUTIVIDADE



Somos de Rio Verde,
E INOVAMOS PARA O MUNDO!



www.simpleagro.com.br



SIMPLE VERDE
BIOTECHNOLOGY

- Promove o crescimento das raízes;
- Induz o enraizamento;
- Ameniza efeitos do estresse hídrico;
- Auxilia na absorção de nutrientes;
- Promove o bom rendimento da planta garantindo altas produtividades;
- Solução de vitaminas.

Natureza Física: Solução SL

Densidade: 1.05 g/ml

Garantia: N não solúvel em água 1,4%(14,7g/L)

Maior relação soluto/solvente para aplicação: 0,15 m/L



Recomendado para:



SOJA



MILHO



FEIJÃO



SORGO



ALGODÃO



CANA-DE-AÇÚCAR

Composição do produto:

Água e Ureia. Aditivos: Dispersantes, emulsificantes e espessantes.

METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EXTRAÍDOS DAS CEPAS:

BVPS01 de Bacillus velezensis e

BVPS02 de Lysinibacillus fusiformis

Modo de uso: Aplicação via TS / Sulco

Dose: 100-200 ml/Ha

Variação da dose: Avaliar o histórico de adubação da área e de aplicação de outros biológicos.



Formulação inovadora exclusiva

100% em meio líquido

- Melhora a absorção de água;
- Estimula a absorção de nutrientes;
- Ação de biocontrole de doenças fúngicas;
- Induz o sistema de defesa das plantas;
- Mantém a planta saudável e eficaz para atingir altos rendimentos de produção;
- Equilíbrio para o solo.

Natureza Física: Solução SL

Densidade: 1.05 g/ml

Garantia: N não solúvel em água 1,4%(14,7g/L)

Maior relação soluto/solvente para aplicação: 0,15 m/L



Recomendado para:



SOJA



MILHO



FEIJÃO



SORGO



ALGODÃO



CANA-DE-AÇÚCAR

Composição do produto:

Água e Ureia. Aditivos: Dispersantes e emulsificantes.

METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EXTRAÍDOS DAS CEPAS:

Trichoderma Harzianum, Trichoderma Asperellum e

Trichoderma Asperelloides

Modo de uso: Aplicação via Foliar / TS / Sulco

Dose: 100-200 ml/Ha

Variação da dose: Avaliar a incidência de patógenos e a mistura de biológicos.



Formulação inovadora exclusiva

100% em meio líquido

- Protege o crescimento das plantas;
- Produz metabólitos letais para embriões de nematoides;
- As toxinas matam os ovos próximos ao sistema radicular;
- Forma biofilme nas raízes impedindo a penetração de nematoides;
- Efeito em 96 horas.

Formulação: Solução SL

Densidade: 1.05 g/ml

Garantia: N não solúvel em água 1,4%(14,7g/L)

Maior relação soluto/solvente para aplicação: 0,15 m/L



Recomendado para:



SOJA



MILHO



FEIJÃO



SORGO



ALGODÃO



CANA-DE-AÇÚCAR

Composição do produto:

Água e Ureia. Aditivos: Dispersantes, emulsificantes e estabilizantes.

METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EXTRAÍDOS DAS CEPAS:

BVBA01 DE Bacillus amyloliquefaciens

Modo de uso: Aplicação via Foliar / TS / Sulco

Dose: 100-200 ml/Ha

Variação da dose: Avaliar a incidência de patógenos e a mistura de biológicos.



Formulação inovadora exclusiva

100% em meio líquido